

# PROBLEM

## A. Ortogonalprojektion

1. Låt  $x = (1, -1, 0, 2)$  och  $y = (3, -1, 1, 1)$ .
  - a. Beräkna  $x \cdot y$ .
  - b. Beräkna vinkeln mellan vektorerna  $x$  och  $y$ .
  - c. Beräkna vinkeln mellan vektorerna  $x - y$  och  $x + y$ .
2. Låt  $e = (2, 1, 2, 1)$  och  $w = (1, 2, -3, 4)$ . Bestäm talet  $s$  så att vektorn  $se + w$  blir ortogonal mot  $e$ .
3. Ortogonalisera följande vektorer med Gram-Schmidts metod.

$$v_1 = (1, 2, 3)^T, \quad v_2 = (3, 2, 1)^T.$$

4. Låt  $e_1 = (2, 1, 0, 1)$ ,  $e_2 = (0, 2, 1, -2)$  och  $w = (1, 2, 1, 2)$ . Visa, att  $e_1$  och  $e_2$  är ortogonala och bestäm sedan talen  $s_1$  och  $s_2$  så att vektorn  $s_1e_1 + s_2e_2 + w$  blir ortogonal mot både  $e_1$  och  $e_2$ .
5. Låt  $V$  vara ett underrum till  $\mathbb{R}^m$  med dimensionen  $n < m$  och låt  $V$  spännaas av kolonnerna i matrisen  $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}$ . Projektionsmatrisen  $P$  för ortogonalprojektion på  $V$  ges av

$$P = Q(Q^T Q)^{-1} Q^T.$$

Visa, att  $P = QQ^T$  om kolonnerna i  $Q$  är ortonormala.

6. Låt

$$u = (1, 1, 1, 1)^T, \quad v = (1, -1, 1, -1)^T.$$

och bilda vektorrummet  $V = \text{span}\{u, v\}$ .

- a. Verifiera att  $u$  och  $v$  är ortogonala.
  - b. Normalisera vektorerna  $u$  och  $v$  till längden 1. Dessa bildar en ON-bas för vektorrummet  $V$ .
  - c. Bilda  $(4 \times 2)$  matrisen  $Q$  med vektorerna i ON-basen som kolonner och beräkna projektionsmatrisen  $P = QQ^T$ .
  - d. Bestäm ortogonalprojektionen  $Pw$  av vektorn  $w = (1, 2, 3, 4)$  på  $V$ .
7. Ange den ortogonala projektionen av  $u = (0, 4, 4, 0)$  på det underrum till  $\mathbb{R}^4$  som genereras av vektorerna

$$e_1 = (1, 2, 3, 1)^T, \quad e_2 = (1, -2, 1, 0)^T.$$

## B. Egenvärden

1. Visa, att 5 är ett egenvärde till matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Använd t.ex. att  $\det(A - \lambda I) = 0$  om  $\lambda$  är ett egenvärde till  $A$ .

2. Visa, att  $x = (1, 0)^T$  är en egenvektor till matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Vilket egenvärde är associerat med denna egenvektor.

3. Beräkna egenvärdena till matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Beräkna egenvärden  $\lambda$  och egenvektorer  $x$  till matriserna

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Givet matriserna

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 13 \end{pmatrix}, \quad P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Beräkna egenvärdena till  $A$ . Visa sedan att matrismultiplikationen  $P^T AP$  ger en diagonal matris.

6. Beräkna egenvärden  $\lambda$  och normaliserade egenvektorer  $x$  till matrisen

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

7. Visa, att om  $\lambda$  är ett egenvärde till  $A$ , så är  $1/\lambda$  ett egenvärde till  $A^{-1}$ .

8. Visa,  $A$  och  $A^T$  har samma egenvärden. *Ledning:* studera ekvationerna  $Ax = \lambda x$  och  $A^T y = \mu y$ . Använd att  $y^T A x = x^T A^T y$  och visa att  $\lambda = \mu$ .

## I. Partiella derivator och kedjeregeln

1. Beräkna de partiella derivatorna  $\partial_x f$  och  $\partial_y f$  till var och en av funktionerna

- a.  $f(x, y) = x^3 + 4y^2 - 4.$
- b.  $f(x, y) = x^2 - 6x + 2y^4.$
- c.  $f(x, y) = xy^2.$
- d.  $f(x, y) = x^3 + 2x^3y^4 - y^4.$

2. Beräkna de partiella derivatorna  $\partial_x f$  och  $\partial_y f$  till funktionerna

- a.  $f(x, y) = \arctan \frac{x}{y}.$
- b.  $f(x, y) = \ln(x^2 + xy).$
- c.  $f(x, y) = \frac{x}{x + y}.$
- d.  $f(x, y) = x^3 e^{xy}.$

3. Derivera partiellt a)  $\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ , b)  $\arctan(x_1 x_2)$  och c)  $e^{2x_1} \sin(x_1 + x_2)$ .

4. Beräkna den partiella derivatan  $f''_{xy}$  till var och en av funktionerna

- a.  $f(x, y) = x^5 y^2.$
- b.  $f(x, y) = xy^4 - y^5.$
- c.  $f(x, y) = 2ye^x.$
- d.  $f(x, y) = x \ln(xy).$

5. Bestäm de partiella derivatorna  $f''_{xx}$ ,  $f''_{xy}$  och  $f''_{yy}$  till funktionen

$$f(x, y) = x^3 + 4x^2y + 8xy^2 + 2y^3.$$

6. Bestäm den partiella derivatan  $f_{xxxy}^{(3)}(1, 2)$  till funktionen

$$f(x, y) = \frac{e^{2x-y}}{x+y}.$$

7. Bestäm de partiella derivatorna  $f''_{xx}$ ,  $f''_{xy}$  och  $f''_{yy}$  till funktionen

$$f(x, y) = e^{xy} + x \ln y.$$

8. Låt  $f(x, y) = xy$  och  $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$ . Använd kedjeregeln

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt},$$

för att beräkna  $df/dt$  då  $t = \pi/2$ .

9. Använd kedjeregeln för att beräkna  $dz/dt$  om

- a.  $z = 3x^2 + 2xy^3$ ,  $x = t$ ,  $y = t^2$ .
- b.  $z = x^3 - 5xy$ ,  $x = t$ ,  $y = t$ .
- c.  $z = x^2y^3 + 3$ ,  $x = 2t^2$ ,  $y = t^3$ .
- d.  $z = x^3y^2$ ,  $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$ .
- e.  $z = xy$ ,  $x = a + \alpha t$ ,  $y = b + \beta t$ .

10. Antag, att  $z = f(x, y)$  är en funktion av två variabler med kontinuerliga partiella derivator. Sätt  $x = 3t + 2$  och  $y = 2t - 1$ . Beräkna  $dz/dt$ .

## II. Gradient och riktningsderivata

1. Beräkna gradientvektorn

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

till följande funktioner  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

- a.  $f(x, y) = x^2 + y^2$ .
- b.  $f(x, y) = (x + y)^2$ .
- c.  $f(x, y) = xy$ .
- d.  $f(x, y) = x^4 + x^3y - 4xy + y^2$ .

2. Bestäm gradienten till funktionerna a)  $e^{xy}$ , b)  $e^{-x^2-y^2}$ , och c)  $\ln(x + y)$ .

3. Bestäm gradientvektorn  $\nabla f(x)$  i punkten  $(3, 3)$  till följande funktioner

- a.  $f(x) = 4x_1^2 + 9x_2^2$ .
- b.  $f(x) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^4 - x_2^5$ .
- c.  $f(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$ .

4. Beräkna längden på gradienten,  $|\nabla f|$ , i punkten  $(1, 2)$  om funktionen  $f$  ges av

$$f(x) = x_1^3 + x_2^3.$$

5. Beräkna gradienten i origo för funktionerna

- a.  $f(x) = f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$ .  
b.  $f(x) = f(x, y) = x^2(1 + y^3) + y^2$ .

Vad kan sägas om funktionerna  $f$  i denna punkt.

6. Bestäm derivatan av funktionen

$$f(x, y) = x^2y^3,$$

i punkten  $(x, y) = (1, 1)$ , längs riktningen  $v = (1, \sqrt{3})$ .

7. Beräkna derivatan i riktningen  $(-1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$  av funktionen

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy,$$

i punkten  $(x, y) = (2, -1)$ .

8. Det skalära fältet  $\phi(x, y, z) = xyz$  är givet. Beräkna  $\nabla\phi$  och riktningsderivatan i riktningen  $v = (2, 3, 5)$ .
9. Beräkna  $f'_v$  av funktionen  $f(x, y) = xy$  i riktningen  $v = (4, 3)$  och i punkten  $(x, y) = (1, 1)$ .
10. Bestäm riktningsderivatan  $f'_v$  av  $f(x, y) = x^2 + xy^2$  i punkten  $(1, 1)$ , i den riktning som ges av vektorn  $v = (1, 2)$ .
11. Bestäm den riktning i vilken funktionen  $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$  växer snabbast i punkten  $(1, 2)$ , samt riktningsderivatan till  $f$  i denna punkt. *Ledning:*  $f'_v = \nabla f \cdot v = |\nabla f| \cos \theta$  om  $|v| = 1$  och  $\theta$  är vinkeln mellan  $\nabla f$  och  $v$ .

### III. Tangentplan

1. Bestäm tangentplanet

$$z = f(\bar{x}, \bar{y}) + \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, \bar{y})(x - \bar{x}) + \frac{\partial f}{\partial y}(\bar{x}, \bar{y})(y - \bar{y}),$$

till funktionen  $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2$  i punkten  $(\bar{x}, \bar{y}) = (2, 2)$ .

2. Bestäm tangentplanet till ytan  $z = x^2 + x + y^2$  i punkten  $(2, 2, 10)$ .
3. Taylorutveckla funktionen  $f(x, y) = xy$  till första ordning i punkten  $(0, 3)$ .
4. Bestäm tangentplanet till ytan  $z = \sin(x^2 + y^2)$  i origo.
5. Beräkna tangentplanet till funktionsytan  $f(x, y) = x^2y$  i punkten  $(-2, 1, 4)$ .
6. Sök tangentplanet till paraboloiden  $f(x, y) = x^2 + y^4 + 1$  i punkten  $(1, 1, 3)$  på ytan.

## IV. Partiella differentialekvationer, PDE

1. Visa, att  $f(x, t) = x - y$  är en lösning till

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

2. Visa, att  $f(x, t) = 2xy - y^2$  är en lösning till den partiella differentialekvationen

$$y \left( \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \right) - f = y^2.$$

3. Visa, att  $u(x, y) = 2x + 2xy^2 - y^3$  löser den partiella differentialekvationen

$$y \frac{\partial u}{\partial x} + 2y \frac{\partial u}{\partial y} - 4u = 2y - 8x.$$

4. Visa, att om  $n$  är ett godtyckligt heltal och  $A$  och  $B$  reella tal, så är funktionen  $f(x, t) = e^{-n^2bt}(A \cos nx + B \sin nx)$  en lösning till väärmeledningsekvationen

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{b} \frac{\partial f}{\partial t}.$$

5. Visa, att om  $f(x, t) = (x + ct)^3$  och  $g(x, t) = (x - ct)^4$ , så är  $u(x, t) = f(x, t) + g(x, t)$  en lösning till vågekvationen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}.$$

## V. Kurvor och ytor

1. Rita följande kurvor för hand eller i *MATLAB*

- a.  $f(x, y) = x^2 + y^2$ .
- b.  $f(x, y) = x^2 - y^2$ .
- c.  $f(x, y) = \sin x \sin y$ .
- d.  $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$ .

2. Beräkna derivatan  $A'(t)$  av vektorn  $A(t) = (\cos t, \sin t, 2t)$ . Rita grafen till  $A(t)$ .

3. En partikel rör sig längs kurvan  $\Gamma(t) = (t^2, 3t, 1)$ . Beräkna då  $t = 3$  a) hastigheten  $v = \Gamma'(t)$ , b) farten  $|v|$  och c) accelerationen  $v'(t)$ .

4. En partikel rör sig längs kurvan  $\Gamma(t) = (\sin t, 3 \cos t, t^2)$ . Beräkna då  $t = \pi/2$   
a) hastigheten  $v = \Gamma'(t)$ , b) farten  $|v|$  och c) accelerationen  $v'(t)$ .
5. Integrera vektorn  $\int_0^1 B(t) dt$ , där  $B(t) = (e^t, \sin t, 2t)$ .
6. Beräkna längden  $L = \int \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$  på de parametriserade kurvorna
  - a.  $\Gamma : (x, y) = (\cos t, \sin t)$ ,  $0 \leq t \leq \pi$ .
  - b.  $\Gamma : (x, y) = (t, t)$ ,  $0 \leq t \leq 4$ .
  - c.  $\Gamma : (x, y) = (t, \cosh t)$ ,  $-1 \leq t \leq 1$ .

## Svar

### A. Ortogonalprojektion

1. a) 6 b)  $\pi/4$  c)  $\arccos(-1/\sqrt{5})$
2.  $s = -1/5$
3.  $u_1 = v_1/\|v_1\| = (1, 2, 3)^T/\sqrt{14}$ ,  $u_2 = (4, 1, -2)^T/\sqrt{21}$ .
4.  $s_1 = -1$ ,  $s_2 = -1/9$ .
5.  $Q$ :s kolonner ortonormala dvs.  $Q^T Q = I$ . Projektionen blir

$$P = Q(Q^T Q)^{-1} Q^T = QI^{-1} Q^T = QIQ^T = QQ^T.$$

Observera att  $QQ^T \neq I$  eftersom  $Q$  är av typ  $(m \times n)$ .

6. c)

$$Q = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad P = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- d)  $(2, 3, 2, 3)^T$
7.  $\frac{2}{3}(1, 6, 5, 2)^T$

### B. Egenvärden

1. Matrisen  $A - 5I$  är uppåt triangulär med ett element 0 på diagonalen. Alltså är  $\det(A - 5I) = 0$ .
2.  $\lambda = 2$
3.  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = 7$ , och  $\lambda_3 = 1$
4. A:  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = 5$  och  $x_2 = (0, 1)^T$ ,  $x_1 = (1, -1)^T$ .  
B:  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = 1$  och  $x_1 = (-1, 1)^T$ ,  $x_2 = (1, 1)^T$ .
5.  $\lambda_1 = 5$  och  $\lambda_2 = 15$ .
6.  $\lambda_1 = -1$ ,  $\lambda_2 = 8$  och  $x_1 = (-1, 1)^T/\sqrt{2}$ ,  $x_2 = (1, 1)^T/\sqrt{2}$ .

### I. Partiella derivator och kedjeregeln

1. a.  $\partial_x f = 3x^2$ ,  $\partial_y f = 8y$   
b.  $\partial_x f = 2x - 6$ ,  $\partial_y f = 8y^3$   
c.  $\partial_x f = y^2$ ,  $\partial_y f = 2xy$

- d.  $\partial_x f = 3x^2 + 6x^2y^4$ ,  $\partial_y f = 8x^3y^3 - 4y^3$
2. a.  $\partial_x f = (y + x^2/y)^{-1}$ ,  $\partial_y f = -x(y^2 + x^2)^{-1}$   
b.  $\partial_x f = (2x + y)(x^2 + xy)^{-1}$ ,  $\partial_y f = x(x^2 + xy)^{-1}$   
c.  $\partial_x f = y(x + y)^{-2}$ ,  $\partial_y f = -x(x + y)^{-2}$   
d.  $\partial_x f = 3x^2e^{xy} + x^3ye^{xy}$ ,  $\partial_y f = x^4e^{xy}$
3. a.  $\partial_{x_1} f = x_1(x_1^2 + x_2^2)^{-1/2}$ ,  $\partial_{x_2} f = x_2(x_1^2 + x_2^2)^{-1/2}$   
b.  $\partial_{x_1} f = x_2(1 + x_1^2x_2^2)^{-1}$ ,  $\partial_{x_2} f = x_1(1 + x_1^2x_2^2)^{-1}$   
c.  $\partial_{x_1} f = 2e^{2x_1} \sin(x_1 + x_2) + e^{2x_1} \cos(x_1 + x_2)$ ,  $\partial_{x_2} f = e^{2x_1} \cos(x_1 + x_2)$
4. a.  $f''_{xy} = 10x^4y$ ,  
b.  $f''_{xy} = 4y^3$   
c.  $f''_{xy} = 2e^x$   
d.  $f''_{xy} = 1/y$
5.  $f''_{xx} = 6x + 8y$ ,  $f''_{xy} = 8x + 16y$ ,  $f''_{yy} = 16x + 12y$
6.  $f_{xx}^{(3)}(1, 2) = -32/27$
7.  $f''_{xx} = y^2e^{xy}$ ,  $f''_{xy} = e^{xy}(1 + xy) + y^{-1}$ ,  $f''_{yy} = x^2e^{xy} - xy^{-2}$
8. -1
9. a.  $14t^6 + 6t$   
b.  $3t^2 - 10t$   
c.  $52t^{12}$   
d.  $2\cos^4 \sin t - 3\cos^2 t \sin^3 t$   
e.  $\alpha(b + \beta t) + \beta(a + \alpha t)$
10. Kedjeregeln ger  $\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{dx} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{dy} \frac{dy}{dt} = 3\frac{\partial f}{dx} + 2\frac{\partial f}{dy}$ .

## II. Gradient och riktningsderivata

1. a.  $\nabla f = (2x, 2y)$   
b.  $\nabla f = (2(x + y), 2(x + y))$   
c.  $\nabla f = (y, x)$   
d.  $\nabla f = (4x^3 + 3x^2y - 4y, x^3 - 4x + 2y)$
2. a.  $\nabla f = (ye^{xy}, xe^{xy})$   
b.  $\nabla f = (-2xe^{-x^2-y^2}, -2ye^{-x^2-y^2})$   
c.  $\nabla f = \left(\frac{1}{x+y}, \frac{1}{x+y}\right)$

3. a)  $\nabla f(3, 3) = (24, 54)$ , b)  $\nabla f(3, 3) = (0, -303)$ , c)  $\nabla f(3, 3) = (9, 9)$

4.  $\sqrt{153}$

5. a) och b)  $\nabla f(0, 0) = (0, 0)^T$  stationär punkt

6.  $1 + \frac{3}{2}\sqrt{3}$

7.  $-21/\sqrt{5}$

8.  $(2yz + 3xz + 5xy)/\sqrt{38}$

9.  $7/5$

10.  $7/\sqrt{5}$

11. Maximala riktningsderivatan är  $|\nabla f(1, 2)| = \sqrt{5}/2$  i riktningen  $v = (-1, -2)/\sqrt{5}$ , dvs. i gradienmtens riktning.

### III. Tangentplan

1.  $z = 8x + 12y - 20$

2.  $z = 5x + 4y - 8$

3.  $z = 3x$

4.  $z = 0$

5.  $4x - 4y + z + 8 = 0$

6.  $z = 2x + 4y - 3$

### IV. Partiella differentialekvationer, PDE

-

### V. Kurvor och ytor

1. -

2.  $A'(t) = (-\sin t, \cos t, 2)$

3. a)  $v = (6, 3, 0)$ , b)  $\sqrt{45}$ , c)  $v' = (2, 0, 0)$

4. a)  $v = (0, -3, \pi)$ , b)  $\sqrt{9 + \pi^2}$ , c)  $v' = (-1, 0, 2)$

5.  $(e - 1, 1 - \cos 1, 1)$

6. a)  $\pi$ , b)  $4\sqrt{2}$ , c)  $e - 1/e$